

遵從醫囑

約四分之一孕婦的陰道會發現鏈球菌，多數是沒有症狀的，若是帶菌者，她們需要在開始作動時馬上入院打抗生素，直至生產完畢。然後，嬰兒要接受觀察，需要時抽血化驗有否受感染。如有懷疑，嬰兒也需要打抗生素。因為如嬰兒感染早發性的乙型鏈球菌，約5%會死亡及7%會有嚴重長遠影響（建議每位孕婦在36周檢驗有否帶菌）。如病人上一胎已有乙型鏈球菌，今胎作動時便須打抗生素，但不必再化驗是否帶菌者。

2012年某天正懸掛10號風球，我突然收到醫院來電，說產婦38周，第二

胎，已見紅及出現陣痛5小時才入院，雖然我已預先告訴她，如穿水、肚痛、見紅，必須立即入院。尤其是她產前驗出陰道有乙型鏈球菌，作動時應盡快注射抗生素，以減低寶寶因感染而引發的併發症（包括肺炎、腦膜炎），最理想是打了抗生素殺掉陰道病菌後才生產。不過，該孕婦認為第一胎花了十多小時才誕下嬰兒，所以自作主張延遲入院。入院後，護士發現其宮頸已開了5度，立刻注射抗生素及緊急召我回醫院，因10度便可生產。

駕車往醫院途中，頭上的天橋有車經過，濺起的洪水從天橋傾瀉，把我的擋

風玻璃完全遮蓋，自然反應是緊急煞車。頓時間儀錶板的燈完全熄滅，按開車掣已全沒反應。我離開車廂，打算致電醫院找另一位醫生為孕婦接生。豈料當我打開車門，排山倒海的風力及雨水將手上的電話打跌在地上。我拾回濕透的電話，發現屏幕已沒有顯示。晴天霹靂，怎樣通知醫院？正在徬徨無助、心急如焚之際，有一貨車駛至，司機問：「這裏很危險，需要載你一程嗎？」當時腦海裏只有那病人，已無暇考慮自身安全，二話不說便上車。

到醫院後，順利為寶寶接生，寶寶沒有受感染。病人感謝我和護士，我告訴她背後的無名英雄是那義載我的司機。如果病人能遵從醫囑，對病人是更安全的。不過看到母子平安，一切辛勞都是值得的。

作者為婦產科專科醫生